

### 3.4.3 低身長 (-2SD以下)

対象を15歳以下とした。

	カテゴリ区分①		検定
	BU(経静脈)を含むレジメン n=407	BU(経口)を含むレジメン n=36	
低身長無	287 (70.5%)	28 (77.8%)	$P = 0.80$
低身長有	57 (14.0%)	4 (11.1%)	
不明*	60 (14.7%)	4 (11.1%)	
未記載	3 (0.7%)	0 (0.0%)	

\* 成人(not applicable)と入力された1件を含む(BU(経静脈)を含むレジメン:1件)

	カテゴリ区分②				検定
	BU(経静脈) +CY±other drugs n=157	CY+TBI±other drugs n=454	BU(経静脈) +FL±other drugs n=145	FL+TBI±other drugs n=333	
低身長無	123 (78.3%)	349 (76.9%)	82 (56.6%)	252 (75.7%)	$P < 0.001$
低身長有	15 (9.6%)	43 (9.5%)	31 (21.4%)	41 (12.3%)	
不明*	18 (11.5%)	48 (10.6%)	31 (21.4%)	34 (10.2%)	
未記載	1 (0.6%)	14 (3.1%)	1 (0.7%)	6 (1.8%)	

\* 成人(not applicable)と入力された6件を含む(CY+TBI±other drugs:6件)