

### 3.4.3 低身長 (-2SD以下)

対象を15歳以下とした。

	カテゴリ区分①		検定
	BU(経静脈)を含むレジメン n=477	BU(経口)を含むレジメン n=39	
低身長無	330 (69.2%)	32 (82.1%)	p=0.39
低身長有	75 (15.7%)	4 (10.3%)	
不明*	69 (14.5%)	3 (7.7%)	
未記載	3 (0.6%)	0 (0.0%)	

\* 成人(not applicable)と入力された1件を含む(BU(経静脈)を含むレジメン:1件)

	カテゴリ区分②				検定
	BU(経静脈) +CY±other drugs n=181	CY+TBI±other drugs n=517	BU(経静脈) +FL±other drugs n=169	FL+TBI±other drugs n=416	
低身長無	134 (74.0%)	404 (78.1%)	97 (57.4%)	315 (75.7%)	p<0.001
低身長有	23 (12.7%)	49 (9.5%)	37 (21.9%)	53 (12.7%)	
不明*	23 (12.7%)	49 (9.5%)	34 (20.1%)	41 (9.9%)	
未記載	1 (0.6%)	15 (2.9%)	1 (0.6%)	7 (1.7%)	

\* 成人(not applicable)と入力された7件を含む(CY+TBI±other drugs:7件)