

3.4.3 低身長 (-2SD以下)

対象を15歳以下とした。

	カテゴリ区分①		検定
	BU(経静脈)を含むレジメン n=550	BU(経口)を含むレジメン n=41	
低身長無	384 (69.8%)	33 (80.5%)	p=0.52
低身長有	96 (17.5%)	5 (12.2%)	
不明*	66 (12.0%)	3 (7.3%)	
未記載	4 (0.7%)	0 (0.0%)	

* 成人(not applicable)と入力された1件を含む(BU(経静脈)を含むレジメン:1件)

	カテゴリ区分②				検定
	BU(経静脈) +CY±other drugs n=195	CY+TBI±other drugs n=559	BU(経静脈) +FL±other drugs n=209	FL+TBI±other drugs n=482	
低身長無	141 (72.3%)	432 (77.3%)	129 (61.7%)	368 (76.4%)	p<0.001
低身長有	33 (16.9%)	62 (11.1%)	43 (20.6%)	58 (12.0%)	
不明*	20 (10.3%)	51 (9.1%)	35 (16.8%)	48 (10.0%)	
未記載	1 (0.5%)	14 (2.5%)	2 (1.0%)	8 (1.7%)	

* 成人(not applicable)と入力された8件を含む(CY+TBI±other drugs:7件, FL+TBI±other drugs:1件)